



PRIJENOS HANTAVIRUSA:

- direktnim kontaktom s glodavcima
- udisanjem **zaraženog zraka** od izlučevina glodavaca (**mokraća, izmet, slina**)
- zaraženim, **neopranim** voćem i povrćem

Bolest se ne prenosi s čovjeka na čovjeka.

NE MESTI!

Smočite moguće zagađeno područje **sredstvom za dezinfekciju koje sadrži klor ili alkohol** i oprezno očistite bez podizanja prašine.
Koristite masku i gumene rukavice.



Izbjegavajte kontakte s glodavcima i njihovim izlučevinama.

Držite mjesto boravka čistim.
Prozračite vikendice, garaže, podrumne **prije ulaska ili čišćenja**.
Izbjegavajte ležanje na zemlji.



Spriječite ulazak glodavaca.

Zatvoriti rupe betonom ili metalnim štitnikom.
Pokosite travu i grmlje u okolini kuće (do 50 m).



“MIŠJA GROZNICA”

Virusna bolest - uzrokuju hantavirusi

PERITE RUKU sapunom i toplom vodom nakon rada na kući, okućnici i boravka u prirodi.

Ne dirajte lice prljavim rukama.

U prirodi koristite mokre maramice na bazi alkohola.

PRIJENOSNICI HANTAVIRUSA U HRVATSKOJ:
sitni šumski glodavci (voluharice, šumski i poljski miševi)



riđa voluharica žutogrli šumski miš prugasti poljski miš obični šumski miš

SIMPTOMI BOLESTI:

povišena temperatura, jaka glavobolja, zimica, bolovi u leđima i trbuhu, mučnina, zamućenje vida.
Javljaju se **unutar 1-2 tjedna**, no mogu se javiti i nakon 45 dana.



Osigurajte hranu i piće od pristupa glodavaca.

Pospremite svu hranu i smeće u **zatvorene spremnike**.

Uskladištite hranu i vodu za kućne ljubimce i/ili domaće životinje.
Sve sirove plodove ubrane u šumi i poljima **temeljito operite** prije jela.



Uklonite mjesta pogodna za sklonište glodavcima.

Podignite od zemlje sve spremnike, sijeno i premjestite ih barem **50 m od kuće**.
Odstranite krupni otpad.



Ne uništavajte prirodne grabežljivce glodavaca:

- zmiје (poskok, riđovka, bjelica)
- ptice (sove, škanjac, jastreb)

